



Technovin Καρδάτου
Οινοποιητικός εξοπλισμός & αναλώσιμα
Τηλ. 22960 28416
technovi@otenet.gr
www.technovin.gr
Fax 22960 28110
39ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
19100 Μέγαρα, Αττική

Enologica Vason (Vason Group)

TANINESΣ

BARREL TAN L

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ταννίνη σε διάλυμα για χρήση στην οινοποίηση, προερχόμενη από ξύλο αμερικάνικης και γαλλικής δρυός.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η BARREL TAN L είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, το οποίο παραλαμβάνεται με πολύ ειδικές και προσεκτικές διαδικασίες από τις καλύτερες πρώτες ύλες. Η εκχύλιση και παραλαβή των τανινών γίνεται με χρήση νερού, είναι αργή και έχει μελετηθεί η θερμοκρασία και η διάρκεια της ζήρασης. Αυτό επιτρέπει την παραλαβή πολυφαινολικών ενώσεων με πολύ ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και χωρίς να προσδίδουν ανεπιθύμητη τανικότητα. Η παραλαβή ενώσεων από την υδρόλυση της λιγνίνης του ξύλου δίνει στην BARREL TAN L χαρακτήρα χωρίς νότες άσχημου και επιθετικού "ξύλου" αλλά με νότες καπνού, σοκολάτας, με αίσθηση απαλή, μαλακιά και διακριτική, ακόμα και όταν χρησιμοποιηθεί στις υψηλότερες δόσεις.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι εγγυημένα από τους εργαστηριακούς ελέγχους της Enologica Vason, οι οποίοι ικανοποιούν τις προδιαγραφές του Διεθνούς Κώδικα Οινολογίας (Codex Enologique International).

ΧΡΗΣΕΙΣ

Η BARREL TAN L χρησιμοποιείται στην κατεργασία λευκών και ερυθρών οίνων καθώς και αποσταγμάτων. Στην περίπτωση των οίνων, χρησιμοποιείται κατά τη παλαίωση σε δρύινα βαρέλια, ειδικά όταν αυτά είναι χρησιμοποιημένα και «εξαντλημένα» από τα συστατικά του ξύλου. Αυτό βοηθάει επίσης και στη σταθεροποίηση του χρώματος αυτών των οίνων.

Η BARREL TAN L μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις τελικές φάσεις επεξεργασίας και εμφιάλωσης λευκών και ερυθρών οίνων. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται η χρήση πριν από το τελευταίο φιλτράρισμα και μόνο σε οίνους που είναι πρωτεϊνικά σταθεροποιημένοι.

Σε κάθε περίπτωση συνιστώνται προκαταρκτικές δοκιμές, προσθήκης μεταβλητών ποσοτήτων ταννίνης, προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιθυμητές οργανοληπτικές αλληλεπιδράσεις με το προϊόν καθώς και η κατάλληλη δόση των ταννινών.

Για τη χρήση του η BARREL TAN L, τηρήστε τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από τη χρήση αναδεύουμε το προϊόν στη συσκευασία του και διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα της BARREL TAN L σε 10 μέρη οίνου. Προσθέτουμε στο προς επεξεργασία προϊόν και ομογενοποιούμε. Δεν χρησιμοποιούμε μεταλλικά αντικείμενα και νερό με μεγάλη περιεκτικότητα ασβεστούχων αλάτων. Συνιστάται η χρήση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από το μετέπειτα φιλτράρισμα.

Είναι πάντα χρήσιμο να ελέγχεται η πρωτεϊνική σταθερότητα του οίνου πριν από την επεξεργασία, μολονότι το η BARREL TAN L παρουσιάζει περιορισμένη δραστηριότητα έναντι των πρωτεϊνικών ενώσεων.

ΔΟΣΕΙΣ

1 - 15 ml/hl για ερυθρούς οίνους.

1 - 5 ml/hl για λευκούς οίνους.

5 - 40 ml/hl για αποστάγματα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιάλη του 1 κιλού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διατηρήστε σε δροσερό και στεγνό μέρος. Κλείστε προσεκτικά τις ανοικτές συσκευασίες.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

Το προϊόν ταξινομείται ως μη επικίνδυνο.