



Technovin Καρδάτου
Οινοποιητικός εξοπλισμός & αναλώσιμα
Τηλ. 22960 28416
technovi@otenet.gr
www.technovin.gr
Fax 22960 28110
39ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
19100 Μέγαρα, Αττική

Enologica Vason (Vason Group)

TANINESΣ

EASY TAN[®] HARVEST SG

ΣΥΝΘΕΣΗ

Μίγμα ελλαγιτανινών, παραλαμβάνεται με χρήση υδραλκοολικού διαλύματος και φυσική ξήρανση με αέρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ητανίνη EASY TAN[®] HARVEST SG είναι το προϊόν της προσεκτικής και ήπιας εκχύλισης με υδραλκοολικό διάλυμα του ξύλου δρυός. Η διαδικασία και η τεχνική της εκχύλισης των συστατικών του ξύλου (μόνο από το κέντρο του κορμού) είναι τέτοια που προκαλεί την αργή και ήπια εκχύλιση μόνο των πιο "ευγενών" πολυφαινολικών συστατικών.

Η προσθήκη της EASY TAN[®] HARVEST SG σε λευκούς ροζέ και ερυθρούς οίνους προσφέρει προστασία από οξειδώσεις, ενώ συνεισφέρει στη δομή και στον όγκο.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι εγγυημένα από τους εργαστηριακούς ελέγχους της Enologica Vason, οι οποίοι ικανοποιούν τις προδιαγραφές του Διεθνούς Κώδικα Οινολογίας (Codex Enologique International).

ΧΡΗΣΕΙΣ

Η EASY TAN[®] HARVEST SG χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της εκχύλισης στην ερυθρή οινοποίηση, για την πρωτεϊνική σταθεροποίηση και για την προστασία από οξειδώσεις των λευκών οίνων. Επίσης έχει πολύ ισχυρή διαυγαστική δράση τόσο στο γλεύκος (κυρίως) όσο και στον οίνο.

Η EASY TAN[®] HARVEST SG μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις τελικές φάσεις επεξεργασίας και εμφιάλωσης λευκών και ερυθρών οίνων. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται η χρήση πριν από το τελευταίο φιλτράρισμα και μόνο σε οίνους που είναι πρωτεϊνικά σταθεροποιημένοι.

Σε κάθε περίπτωση συνιστώνται προκαταρκτικές δοκιμές προσθήκης μεταβλητών ποσοτήτων ταννίνης, προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιθυμητές οργανοληπτικές αλληλεπιδράσεις με το προϊόν καθώς και η κατάλληλη δόση των ταννινών.

Για τη χρήση του EASY TAN® HARVEST SG τηρήστε τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύουμε καλά την απαιτούμενη ποσότητα του EASY TAN® HARVEST SG σε 10 μέρη νερού και το προσθέτουμε στο προς επεξεργασία προϊόν. Δεν χρησιμοποιούμε μεταλλικά αντικείμενα και νερό με μεγάλη περιεκτικότητα ασβεστούχων αλάτων. Στη περίπτωση προσθήκης λίγο πριν από την εμφιάλωση, συνιστάται η διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών για την ορθή δόση και για την αλληλεπίδραση με τις πρωτεΐνες (χρήση σε πρωτεϊνικά σταθεροποιημένους οίνους).

ΔΟΣΕΙΣ

5 - 30 gr/hl κατά την εκχύλιση (ερυθρή οινοποίηση)

1 - 5 gr/hl για λευκούς και ροζέ οίνους

10 - 40 gr/hl για ξύδι

5 - 30 gr/hl για αποστάγματα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακουλάκια του 0,5 κιλού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διατηρήστε σε δροσερό και στεγνό μέρος, με σωστό εξαερισμό. Κλείστε προσεκτικά τις ανοικτές συσκευασίες.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

Το προϊόν ταξινομείται ως μη επικίνδυνο.