



Technovin Καρδάτου  
Οινοποιητικός εξοπλισμός & αναλώσιμα  
Τηλ. 22960 28416  
[technovi@otenet.gr](mailto:technovi@otenet.gr)  
[www.technovin.gr](http://www.technovin.gr)  
Fax 22960 28110  
39ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου  
19100 Μέγαρα, Αττική

Enologica Vason (Vason Group)

ΔΙΑΥΓΑΣΤΙΚΑ

**MICOSORB PLUS**

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ενεργοποιημένο κολλοειδές πυρίτιο 50%, βοηθητικά φίλτραρίσματα (φυτικά πολυμερή υψηλής προσροφητικότητας) 50%.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το MICOSORB® Plus είναι ένα σκεύασμα το οποίο μειώνει τα επίπεδα της ωχρατοξίνης Α στους οίνους. Το κολλοειδές πυρίτιο το οποίο περιέχει, προέρχεται από ειδική κατεργασία του SiO<sub>2</sub> το οποίο έχει την ιδιότητα να προσροφά λιπόφιλα μόρια και με αυτό το τρόπο να συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων της ωχρατοξίνης Α. Η συνεργειακή δράση των φυτικών πολυμερών τα οποία υπάρχουν στο MICOSORB® Plus, καθιστούν εφικτή την μείωση της ωχρατοξίνης Α σε επίπεδα ασφαλείας ακόμα και σε οίνους με αυξημένη περιεκτικότητα σε αυτή την μυκοτοξίνη.

Το MICOSORB® Plus είναι απόλυτα αδρανές και δεν επηρεάζει τον οίνο.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το MICOSORB® Plus χρησιμοποιείται για την κατεργασία οίνων με αυξημένα επίπεδα ωχρατοξίνης Α (συνήθως από 1,5 έως 4-5 ppb). Συγκεκριμένα, προσθήκη 10gr/hl από το MICOSORB® Plus μειώνουν τη συγκέντρωση της ωχρατοξίνης Α κατά περίπου 1,5 ppb. Το προϊόν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε λευκούς οίνους, ενώ σε ερυθρούς παρατηρείται μια μείωση της δραστηριότητας κατά περίπου 10%, οπότε σε αυτούς τους οίνους πρέπει να αυξήσουμε ανάλογικά την δόση του MICOSORB® Plus.

Για τη χρήση του MICOSORB® Plus τηρήστε τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύουμε το MICOSORB® Plus στο νερό, σε αναλογία 1:10 και το προσθέτουμε στον προς κατεργασία οίνο εξασφαλίζοντας καλή ομογενοποίηση. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να δράσει πλήρως το MICOSORB® Plus είναι 2 ώρες. Φυσικά πρέπει να προηγηθεί της κατεργασίας με το MICOSORB® Plus η ακριβής μέτρηση της συγκέντρωσης της ωχρατοξίνης A στον οίνο.

#### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

10 gr/hl από το MICOSORB® Plus μειώνουν κατά 1,5 ppb την συγκέντρωση της ωχρατοξίνης A σε λευκό οίνο με αρχική συγκέντρωση ωχρατοξίνης A 3 ppb. Σε ερυθρούς οίνους αυξάνουμε την δόση του MICOSORB® Plus κατά περίπου 10%.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκοι των 10 κιλών.

#### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διατηρήστε σε δροσερό και στεγνό μέρος. Κλείστε προσεκτικά τις ανοικτές συσκευασίες.

#### ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

Το προϊόν ταξινομείται ως μη επικίνδυνο.